

Nutzungsgruppen Biotoptypen

- Quelle

●

Auenstandgewässer, Altwasser

●

Standgewässer

●

Moore, Sümpfe

●

Rohboden-/Extremstandorte, Zwergstauchheiden

●

Feldgehölze / Waldreste, Gebüsche, Bäume

●

Anthropogen gestörte Standorte

○

Siedlung/Gewerbe
- Fließgewässer, schmal
- Auenstandgewässer, Altwasser
- Rohboden-/Extremstandorte, Zwergstauchheiden
- Feldgehölze / Waldreste, Gebüsche, Bäume
- Ufergehölz
- Anthropogen gestörte Standorte
- Verkehrsflächen
- Meeresflächen
- Watt
- Küstenvegetation
- Bauwerk Küste
- Fließgewässer, schmal
- Fließgewässer, breit
- Auenstandgewässer, Altwasser
- Standgewässer
- Bauwerk Standgewässer
- Moore, Sümpfe
- Acker, Ackerbrache
- Grünland, extensiv oder feucht
- Intensivgrünland/Einsaat
- Stark verändertes Weideland
- Gartenbau
- Kraut-/Staudenfluren, Säume, Brachen
- Rohboden-/Extremstandorte, Zwergstauchheiden
- Feldgehölze / Waldreste, Gebüsche, Bäume
- Aufforstung, Kahlschlag
- Laubwald, Laubmischwald, Laub dominierend
- Nadelwald, Nadelmischwald, Nadel dominierend
- Ufergehölz
- Waldrand
- Vorwald, Pionierstadium
- Anthropogen gestörte Standorte
- Siedlung/Gewerbe
- Verkehrsflächen
- Freizeit, Erholung, Grün- und Freiflächen

Fauna (Erhaltungsziel-Arten)*

- Brutvogel
- Funktionsraum Rastvögel

Brutvögel		Rastvögel	
Kürzel	Name deutsch	Kürzel	Name deutsch
Bf	Baumfalke	Nt	Neuntöter
Blk	Blaukehlchen	Row	Rohrweihe
Brg	Brandgans	Sn	Schnatterente
Ev	Eisvogel	Sr	Schilfrohrsänger
Fl	Feldlerche	Swk	Schwarzkehlchen
Frp	Flussregenpfeifer	T	Teichrohrsänger
Fs	Feldschwirl	U	Uferschwalbe
Gr	Gartenrotschwanz	Us	Uferschnepfe
Gbv	Großer Brachvogel	W	Wiesenpieper
Ki	Kiebitz	Wa	Wachtel
Kr	Krickente	Wr	Wasserralle
Ló	Löffelente	Ws	Weißstorch
N	Nachtigall		

Kürzel	Name deutsch	Kürzel	Name deutsch
R-Asl	R-Alpenstrandläufer	R-Kw	R-Kornweihe
R-Blg	R-Blässgans	R-Lm	R-Lachmöwe
R-Br	R-Blässhuhn	R-Ló	R-Löffelente
R-Dwl	R-Dunkler Wasserläufer	R-Pfe	R-Pfeifente
R-Gäs	R-Gänsesäger	R-Rei	R-Reiherente
R-Gra	R-Graugans	R-Sb	R-Säbelschnäbler
R-Grr	R-Graureiher	R-Sl	R-Schellente
R-Güs	R-Grünschenkel	R-Sn	R-Schnatterente
R-Ht	R-Haubentaucher	R-Spe	R-Spießente
R-Hó	R-Höckerschwan	R-Sto	R-Stockente
R-Ka	R-Kampfläufer	R-Stm	R-Sturmmöwe
R-Kch	R-Kranich	R-Waw	R-Waldwasserläufer
R-Ki	R-Kiebitz	R-Wwg	R-Weißwangengans
R-Ko	R-Kormoran	R-Zsa	R-Zwergsäger
R-Kr	R-Krickente	R-Zt	R-Zwergtaucher

FFH-Lebensraumtypen

- 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 7220 Kalktuffquellen
- 1110 Überspülte Sandbänke
- 1130 Ästuarien
- 1140 Vegetationsfreies Schlick-, Sand- und Mischwatt
- 1150 Lagunen (Strandseen)
- 1160 Flache große Meeresarme und -buchten
- 1170 Riffe
- 1210 Einjährige Spülsäume
- 1220 Mehrjährige Vegetation der Geröll-, Kies- und Blockstrände
- 1310 Quellerwatt
- 1320 Schlickgrasbestände
- 1330 Atlantische Salzwiesen
- 1340 Binnenland-Salzstellen
- 2110 Primärdünen
- 2120 Weißdünen mit Strandhafer
- 2130 Graudünen mit krautiger Vegetation
- 2140 Küstendünen mit Krähenbeere
- 2150 Küstendünen mit Besenheide
- 2170 Dünen mit Kriech-Weide
- 2180 Bewaldete Küstendünen
- 2190 Feuchte Dünentäler
- 2310 Sandheiden mit Besenheide und Ginster auf Binnendünen
- 2320 Sandheiden mit Krähenbeere auf Binnendünen
- 2330 Offene Grasflächen mit Silbergras und Straußgras auf Binnendünen
- 3110 Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer mit Strandlings-Gesellschaften
- 3130 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwergbinsen-Gesellschaften
- 3140 Nährstoffarme bis mäßig nährstoffreiche kalkhaltige Stillgewässer mit Armleuchteralgen
- 3150 Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften
- 3160 Dystrophe Stillgewässer
- 3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation
- 3270 Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-Gesellschaften auf Schlammhängen
- 4010 Feuchte Heiden mit Glockenheide
- 4030 Trockene Heiden
- 5130 Wacholderbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen
- 6210 Kalk-(Halb-)Trockenrasen und ihre Verbuschungsstadien (* orchideenreiche Bestände)
- 6230 Artenreiche Borstgrasrasen
- 6410 Pfeifengraswiesen
- 6430 Feuchte Hochstaudenfluren
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen
- 7110 Lebende Hochmoore
- 7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
- 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
- 7150 Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften
- 7210 Sümpfe und Röhrichte mit Schneide
- 7220 Kalktuffquellen
- 7230 Kalkreiche Niedermoore
- 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
- 9110 Hainsimsen-Buchenwälder
- 9120 Atlantische bodensaure Buchen-Eichenwälder mit Stechpalme
- 9130 Waldmeister-Buchenwälder
- 9150 Orchideen-Kalk-Buchenwälder
- 9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder
- 9180 Schlucht- und Hangmischwälder
- 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche
- 91D0 Moorbücher
- 91D1 Birken-Moorwald
- 91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauewälder
- 91F0 Hartholzauewälder
- FFH-LRT unbestimmt

* nur in Bereichen mit aktuell durchgeführten Kartierungen