

SuedOstLink+

Vorhaben Nr. 5a gemäß BBPlG: „Höchstspannungsleitung Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – Isar“, nördlicher Bestandteil: Klein Rogahn/Stralendorf/Warsow/Holthusen/Schossin – Landkreis Börde

Abschnitt F

Bundesfachplanung gemäß § 8 NABEG

Unterlage 06:

Natura 2000-Prüfungen

Anhang 2: Standarddatenbögen

Informationen zum Dokument

Vorhabenträger	50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 10557 Berlin Deutschland T +49 (0)30 5150-0 F +49 (0)30 5150-4477 info@50hertz.com www.50hertz.com
Ansprechpartner*in	Teilprojektleiter*in Roman Keil T +49 (0)30 5150-2102 F +49 (0)30 5150-4477 roman.keil@50hertz.com
Ansprechpartner*in	Fachprojektleiter*in Maximilian Steinke T +49 (0)30 5150-4883 F +49 (0)30 5150-4477 Maximilian.Steinke@50hertz.com
Erstellt durch/ unter Mitwirkung von:	ARGE Umwelt Erdkabel c/o Froelich & Sporbeck GmbH & Co. KG Tuchmacherstraße 47 14482 Potsdam T +49 (0)331 – 70179 0 potsdam@fsumwelt.de
Genehmigungsbehörde	Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen Zulassungsreferat 803 Im Tulpenfeld 4 53113 Bonn

Inhalt

1	FFH-Gebiet DE 3334-301 „Secantsgraben, Milde und Biese“ (ST)	4
2	VSch-Gebiet DE 3334-401 „Milde-Niederung/Altmark“ (ST)	10
3	VSch-Gebiet DE 3437-401 „Elbaue Jerichow“ (ST)	18
4	VSch-Gebiet und FFH-Gebiet DE 3536-301 „Mahlpfuhler Fenn“ (ST)	28
5	FFH-Gebiet DE 3536-302 „Tanger – Mittel- und Unterlauf“ (ST)	35
6	FFH-Gebiet DE 3536-303 „Eschengehege nördlich Tangerhütte“ (ST)	41
7	FFH-Gebiet DE 3634-301 „Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde“ (ST)	46
8	FFH-Gebiet DE 3636-302 „Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel“ (ST)	52
9	FFH-Gebiet DE 3734-301 „Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben“ (ST)	57
10	FFH-Gebiet DE 3734-302 „Haldensleben, Fledermausquartier Bornsche Str. 25“ (ST)	63
11	FFH-Gebiet DE 3735-301 „Untere Ohre“ (ST)	67
12	FFH-Gebiet DE 3736-301 „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ (ST)	73

1 FFH-Gebiet DE 3334-301 „Secantsgraben, Milde und Biese“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3334-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3334-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0016	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Secantsgraben, Milde und Biese		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,4133	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,6361
Fläche:	481,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3136	Seehausen (Altmark)
MTB	3234	Fleetmark
MTB	3235	Meßdorf
MTB	3236	Osterburg (Altmark)
MTB	3334	Kalbe (Milde)
MTB	3335	Bismark (Altmark)
MTB	3435	Uchtspringe
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

862	Stendaler Land
875	Märkische Elbtalniederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D29	Wendland (Altmark)

Bewertung, Schutz:

--	--

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-301_FFH0016.htm[07.10.2020 09:40:37]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Kurzcharakteristik:	Naturnaher Niederungsfluß. Ausgedehnte strukturreiche Grabensysteme mit großer Bedeutung als Lebensraum für gewässerbewohnende Tier- und Pflanzenarten. Wichtiges Verbindungsgewässer für den Fischotter.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Fließgewässer mit Wiesenau und Grünlandnutzung unterschiedlicher Intensität. Solitäräume, Feldgehölze, Kopfweiden, fließgewässerbegleitende Erlen-Eschenwälder. Wichtige Lebensräume seltener Fischarten sowie des Fischotters.
Kulturhistorische Bedeutung:	Das Niederungsgebiet bei Kalbe war z.Zt. des Mesolithikum (Mittelsteinzeit) ein See. Am Rand des ehemaligen Sees liegen mesolithische Siedlungsreste.
geowissensch. Bedeutung:	Holozänes Senkungsgebiet mit moorigen Bildungen über Salinarstruktur Altensalzwedel-Kakerbeck.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	77 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	7 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	6 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	4 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3334-301	3334-401	SPA0009	EGV	b	*	Milde-Niederung/Altmark	2.220,00	26
3334-301	3236-301	FFH0231	FFH	b	/	Uchte unterhalb Goldbeck	14,00	0
3334-301	2935-301	FFH0007	FFH	b	/	Aland-Elbe-Niederung nördlich Seehausen	2.573,00	0
3334-301		0005SDL	LSG	b	*	Ostrand der Arendseer Hochfläche	6.955,00	1
3334-301		0010SDL	LSG	b	*	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	11.174,00	10
3334-301		0010SAW	LSG	b	*	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	1.217,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Veränderung der Grundwasserstände, Entwässerung der Flächen, Beibehaltung der Intensität der landwirtschaftlichen Nutzung in der Mahd und intensiven Beweidung, Gefährdung durch Erschließung, durch Wege und Freizeitnutzung.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A03	Mahd	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-301_FFH0016.htm[07.10.2020 09:40:37]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

F02.03	Angelsport, Angeln	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
G05.04	Vandalismus	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö.- N	rel.- Grö.- L	rel.- Grö.- D	Erh.- Zust.	Ges.- W.- N	Ges.- W.- L	Ges.- W.- D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	75,9300			G	A			I	C			B	2009
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	77,3700			G	A			I	B			B	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	13,5000			G	B			I	B			B	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	4,5000			G	B			I	C			B	2009
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	12,8310			G	D			I					2009
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinus betuli) [Stellario-Carpinetum]	1,7310			G	B			I	B			C	2009

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö.- N	rel.- Grö.- L	rel.- Grö.- D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W.- N	Ges.- W.- L	Ges.- W.- D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	r	3	1	1	h	B	B	B	C	II	2009
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2012
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2012

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-301_FFH0016.htm[07.10.2020 09:40:37]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

FISH	Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger]			r	kD	r	4	2	1	h	B	A	B	C	II	2008
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2012
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2007
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	4	1	1	h	B	B	B	C	II	2014
MAM	Myotis bechsteinii [Bechsteinfledermaus]			g	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2003
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			g	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2003
ODON	Coenagrion mercuriale [Helm-Azurjungfer]			r	kD	r	2	2	1	n	B	B	B	C	II	2006

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	Hyla arborea [Laubfrosch]			X		r	p	g	2009
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2009
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2000
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2010
MAM	MUSTPUTO	Mustela putorius [Iltis]				X	r	p	g	2012
PFLA	CYPEFUSC	Cyperus fuscus [Braunes Zypergras]					r	p	t	1999
PFLA	HYDRMORS	Hydrocharis morsus-ranae [Europäischer Froschbiß]					r	p	g	1999
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	r	g	2009
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-301_FFH0016.htm[07.10.2020 09:40:37]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0004	Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.:	1996	Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen- Anhalt	33 (SH)	72	
st0025	Heidecke, D.:	1988	Naturschutz in den Bezirken Halle und Magdeburg			11-20	
st0012	Stachowiak, G.:	1978	Ergebnisse faunistischer Beobachtungen im Naturschutzgebiet 'Kalbescher Werder'	Natursch.u. naturkdl. Heimatf. in d. Bez. Halle u. Magdeburg	BH	37-39	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, I. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2009

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

2 VSch-Gebiet DE 3334-401 „Milde-Niederung/Altmark“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3334-401

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3334-401	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	SPA0009	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Milde-Niederung/Altmark		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,4931	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,6864
Fläche:	2.220,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	November 1992
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2018
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3234	Fleetmark
MTB	3235	Meßdorf
MTB	3334	Kalbe (Milde)
MTB	3335	Bismark (Altmark)
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

862	Stendaler Land
naturräumliche Haupteinheit:	
D29	Wendland (Altmark)

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Anthropogen stark überformt, weisen die Niederung der Milde und des Secantsgrabens nur noch reliktiert natürliche Vegetationsformen auf. Es dominiert Saatgrasland, von kleineren Ackerflächen und Gehölzen durchbrochen.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Gebiet mit global wichtigen Vogelansammlungen (A4). Gebiet mit regional wichtigen Vogelansammlungen (B1).
Kulturhistorische	Die kulturhistorische Bedeutung dieses Gebietes liegt in den am Ufer eines im Mesolithikum existierenden Siedlungen.

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-401_SPA0009.htm[07.10.2020 09:40:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bedeutung:	
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	17 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	56 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	19 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	3 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	5 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3334-401	3334-301	FFH0016	FFH	b	*	Secantsgraben, Milde und Biese	481,00	6

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Eingriffe in das hydrologische Regime gefährden das Gebiet.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	Änderung der Nutzungsart/-intensität	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A03	Mahd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
F03.01	Jagd	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt

Status:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-401_SPA0009.htm[07.10.2020 09:40:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Anas acuta [Spießente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas clypeata [Löffelente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas crecca [Krickente]			m	G	51 - 100			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas penelope [Pfeifente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas platyrhynchos [Stockente]			m	G	101 - 250			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas querquedula [Knäke]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser albifrons [Blässgans]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser anser [Graugans]			m	G	251 - 500			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser fabalis [Saatgans]			w	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anthus pratensis [Wiesenpieper]			n	M	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aquila pomarina [Schreiadler]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Ardea cinerea [Graureiher]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Ardea cinerea [Graureiher]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Aythya ferina [Tafelente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Aythya fuligula [Reiherente]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Botaurus stellaris			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-401_SPA0009.htm[07.10.2020 09:40:54]

	[Rohrdommel]															
AVE	Branta leucopsis [Weißwangengans]			w	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Buteo buteo [Mäusebussard]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Buteo lagopus [Raufußbussard]			w	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Ciconia ciconia [Weißstorch]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia [Weißstorch]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Coturnix coturnix [Wachtel]			n	M	6 - 10			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Crex crex [Wachtelkönig]			n	G	6 - 10			l	h	C			C	VR	2011
AVE	Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Cygnus cygnus [Singschwan]			w	G	51 - 100			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Cygnus olor [Höckerschwan]			w	G	51 - 100			l	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Egretta alba (= Casmerodius albus [Silberreiher])			w	G	11 - 50			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco columbarius [Merlin]			w	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco peregrinus [Wanderfalke]			w	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]			m	G	6 - 10			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Fulica atra [Blässhuhn]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]			m	G	51 - 100			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]			n	G	6 - 10			l	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Grus grus [Kranich]			n	G	1 - 5			l	s	B			C	VR	2011
AVE	Grus grus [Kranich]			m	G	1.001 - 10.000			l	m	A			B	VR	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntötter]			n	G	51 - 100			l	h	B			C	VR	2011

SOLplus-AUE-000045-MA-DE 03

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus argentatus [Silbermöwe]			m	G	51 - 100			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus canus [Sturmmöwe]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus ridibundus [Lachmöwe]			m	G	51 - 100			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Limicola falcinellus [Sumpfläufer]			m	G	6 - 10			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Limosa limosa [Uferschnepfe]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Limosa limosa [Uferschnepfe]			n	G	1 - 5			l	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Mergus merganser [Gänseäger]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Mergus serrator [Mittelsäger]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			m	G	6 - 10			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			n	G	6 - 10			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			m	G	6 - 10			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Motacilla flava [p.p.; M. flava] [Wiesenschaufelstelze]			n	M	11 - 50			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]			n	G	11 - 50			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Otis tarda [Großtrappe]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR	2011
AVE	Phalacrocorax carbo [Kormoran]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Philomachus pugnax [Kampfläufer]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]			m	G	1.001 - 10.000			l	m	A			C	VR	2011
AVE	Remiz pendulinus [Beutelmeise]			n	G	1 - 5			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Saxicola rubetra [Braunkehlchen]			n	M	11 - 50			l	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]			n	G	1 - 5			l	w	B			C	VR	2011
AVE	Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]			m	G	6 - 10			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Tringa glareola [Bruchwasserläufer]			m	G	11 - 50			l	m	B			C	VR	2011
AVE	Tringa nebularia [Grünschenkel]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Tringa totanus [Rotschenkel]			m	G	1 - 5			l	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Tringa totanus			n	G	1 - 5			l	h	C			C	VR-	2011

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3334-401_SPA0009.htm[07.10.2020 09:40:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

	[Rotschenkel]																Zug	
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]			n	G	1 - 5			l	w	B					C	VR- Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]			m	G	1.001 - 10.000			l	m	A					C	VR- Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]			n	G	11 - 50			l	h	C					C	VR- Zug	2011

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0004	Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.:	1996	Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt	Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt	33 (SH)	72	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung

Dokumentationslink:

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Unbekannt	0 %
-----------	-----

3 VSch-Gebiet DE 3437-401 „Elbaue Jerichow“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3437-401

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3437-401	Gebietstyp:	A
Landesinterne Nr.:	SPA0011	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Elbaue Jerichow		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,9914	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,5572
Fläche:	13.427,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:		Als GGB bestätigt:	
Ausweisung als BEG:		Meldung als BSG:	Oktober 2000
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2018
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Mai 2019
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3137	Werben (Elbe)
MTB	3138	Havelberg
MTB	3237	Goldbeck
MTB	3238	Sandau (Elbe)
MTB	3337	Stendal
MTB	3338	Arneburg
MTB	3437	Tangermünde
MTB	3438	Jerichow
MTB	3537	Grieben
MTB	3538	Genthin
MTB	3636	Rogätz
MTB	3637	Parey
MTB	3736	Zielitz
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

870	Tangerhütter Niederung
871	Bitkau Plate
872	Genthiner Land
875	Märkische Elbtalniederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Überflutungsau im Bereich der unteren Mittelbe. Die Landschaft ist durch ausgedehnte Grünlandbereiche, durchzogen von größeren Altweßern, Flutrinnen, Ackerflächen und Gehölzen geprägt.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Nahrungs-, Brut-, Rast- u. Überwinterungsgebiet autotypischer Vogelarten. Gebiet mit global und regional wichtigen Vogelansammlungen (A4,B1,B2,B3). Gebiet mit Bedeutung in der EU (C2). Top-5-Gebiet (C6)
Kulturhistorische Bedeutung:	D.SPA-Geb.bef.sich in einer vor-u.frühgeschichtl.Kulturlandsch.,d.in allen Perioden dicht besied.war.Im Frühmittelalt.Elbe=Grenze,beids.m.Burgen gesichert.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Februar 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000 erfolgten Meldung an die EU-KOM.

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	19 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	3 %
F1	Ackerkomplex	8 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	42 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	4 %
I2	Feuchgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	14 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	4 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	3 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3437-401		BR0004	BR	b	*	Mittelbe	125.545,00	98
3437-401	2935-401	SPA0006	EGV	b	/	Aland-Elbe-Niederung	5.123,00	0
3437-401	3736-301	FFH0038	FFH	b	+	Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung	1.663,00	12
3437-401	3138-301	FFH0009	FFH	b	+	Elbaue Werben und Alte Elbe Kannenberg	2.213,00	16
3437-401	3437-302	FFH0157	FFH	b	+	Elbaue zwischen Derben und Schönhausen	4.372,00	33
3437-401	3936-301	FFH0050	FFH	b	/	Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg	6.589,00	0
3437-401	3036-301	FFH0008	FFH	b	/	Elbaue Beuster-Wahrenberg	2.920,00	0
3437-401	3138-302	FFH0010	FFH	b	/	Havel nördlich Havelberg	213,00	0
3437-401	3536-302	FFH0034	FFH	b	/	Tanger-Mittel- und Unterlauf	75,00	0
3437-401	3637-301	FFH0037	FFH	b	+	Elbaue bei Bertingen	2.749,00	20
3437-401	3238-302	FFH0012	FFH	b	+	Elbaue zwischen Sandau und Schönhausen	2.434,00	18
3437-401	3735-301	FFH0024	FFH	b	/	Untere Ohre	39,00	0
3437-401		0015OK_	LSG	b	*	Barleber und Jersleber See m. Ohre-	3.396,00	4

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

						u. Elbniederung		
3437-401		0009SDL	LSG	b	*	Arneburger Hang	479,00	2
3437-401		0029SDL	LSG	b	*	Aland-Elbe-Niederung	17.837,00	7
3437-401		0092JL__	LSG	e	*	Elbtalaue	7.608,00	30
3437-401		0006SDL	LSG	b	*	Untere Havel	28.647,00	21
3437-401		0015M__	NSG	b	*	Rogätzter Hang - Ohremündung	259,00	2
3437-401		0045M__	NSG	b	*	Alte Elbe zwischen Kannenberg und Berge	175,00	1
3437-401		0189M__	NSG	b	*	Taufwiesenberge	47,00	0
3437-401		0193M__	NSG	b	*	Elsholzweiden	166,00	1
3437-401		0043M__	NSG	b	*	Bucher Brack-Bölsdorfer Haken	1.088,00	8
3437-401		0010M__	NSG	b	*	Schelldorfer See	125,00	1
3437-401		0009M__	NSG	b	*	Arneburger Hang	8,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	~: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Intensivierung der Landwirtschaft und Flussausbau gefährdet.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A10	Flurbereinigung in landwirtschaftlich genutzten Gebieten	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A05.01	Viehzucht	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
L08	Hochwasser, Überschwemmung (natürlich)	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
LSA: LK Jerichower Land Landkreis Jerichower Land Kreisverwaltung - FB 7 - Umwelt und Landwirtschaft
LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan 2009	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	Acrocephalus arundinaceus [Drosselrohrsänger]			n	G	11 - 50			1	h	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Acrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsänger]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Actitis hypoleucos [Flussuferläufer]			n	G	11 - 50			2	h	B			B	VR-Zug	2011
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Anas acuta [Spießente]			m	G	251 - 500			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas clypeata [Löffelente]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas clypeata [Löffelente]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas crecca [Krickente]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			B	VR-Zug	2011
AVE	Anas crecca [Krickente]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas penelope [Pfeifente]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas platyrhynchos [Stockente]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas querquedula [Knäkente]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas querquedula [Knäkente]			m	G	11 - 50			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas strepera [Schnatterente]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Anas strepera [Schnatterente]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser albifrons [Blässgans]			m	G	10.001 - 100.000			3	m	A			A	VR-Zug	2011
AVE	Anser anser [Graugans]			n	M	101 - 250			1	h	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Anser anser [Graugans]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			B	VR-Zug	2011
AVE	Anser brachyrhynchus [Kurzchnabelgans]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR-Zug	2011

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	Anser erythropus [Zwerggans]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Anser fabalis [Saatgans]			w	G	10.001 - 100.000			2	m	A			A	VR- Zug	2011
AVE	Anthus campestris [Brachpieper]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Anthus pratensis [Wiesenpieper]			n	M	11 - 50			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Aquila pomarina [Schreiadler]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Ardea cinerea [Graureiher]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Asio flammeus [Sumpfohreule]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Aythya ferina [Tafelente]			m	G	1.001 - 10.000			2	m	A			A	VR- Zug	2011
AVE	Aythya fuligula [Reiherente]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Aythya nyroca [Moorente]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Botaurus stellaris [Rohrdommler]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Branta leucopsis [Weißwangengans]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Branta ruficollis [Rothalsgans]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Bucephala clangula [Schellente]			m	G	251 - 500			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Buteo buteo [Mäusebussard]			m	G	51 - 100			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Buteo lagopus [Raufußbussard]			w	G	11 - 50			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Calidris alba [Sanderling]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Calidris alpina [Alpenstrandläufer]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Calidris minuta [Zwergstrandläufer]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Calidris temminckii [Temminckstrandläufer]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Chlidonias hybrida [Weißbartseeschwalbe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Chlidonias niger [Trauerseeschwalbe]			n	G	11 - 50			2	h	C			A	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia [Weißstorch]			m	G	1 - 5			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Ciconia ciconia [Weißstorch]			n	G	1 - 5			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Ciconia nigra [Schwarzstorch]			m	G	11 - 50			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]			w	G	11 - 50			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Crex crex [Wachtelkönig]			n	G	11 - 50			1	h	C			B	VR	2011
AVE	Cygnus columbianus bewickii [Zwergschwan]			m	G	101 - 250			2	m	A			B	VR	2011

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	Cygnus cygnus [Singschwan]			w	G	501 - 1.000			2	m	A			A	VR	2011
AVE	Cygnus olor [Höckerschwan]			w	G	251 - 500			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Dendrocopos medius [Mittelspecht]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Egretta alba (= Casmerodius albus [Silbereiher])			w	G	101 - 250			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Emberiza hortulana [Ortolan]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Falco columbarius [Merlin]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco peregrinus [Wanderfalke]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]			n	M	1 - 5			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Fulica atra [Blässhuhn]			m	G	251 - 500			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]			n	G	11 - 50			1	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]			m	G	101 - 250			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Gavia arctica [Prachtaucher]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Gavia stellata [Sterntaucher]			w	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Grus grus [Kranich]			n	G	6 - 10			1	s	B			C	VR	2011
AVE	Grus grus [Kranich]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			B	VR	2011
AVE	Haematopus ostralegus [Austernfischer]			n	M	1 - 5			1	s	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]			w	G	11 - 50			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Haliaeetus albicilla [Seeadler]			n	G	1 - 5			1	w	A			C	VR	2011
AVE	Hydroprogne caspia [Raubseeschwalbe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Ixobrychus minutus [Zwergdommel]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]			n	G	501 - 1.000			1	h	A			C	VR	2011
AVE	Lanius excubitor [Raubwürger]			n	M	1 - 5			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus argentatus [Silbermöwe]			m	G	251 - 500			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus canus [Sturmmöwe]			m	G	501 - 1.000			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus melanocephalus [Schwarzkopfmöwe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Larus michahellis [Mittelmeermöwe]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Larus ridibundus [Lachmöwe]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Limosa lapponica [Pfuhschnepfe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Limosa limosa [Uferschnepfe]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR- Zug	2011
	Limosa limosa														VR-	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	[Uferschnepfe]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	Zug	2011
AVE	Locustella luscinioides [Rohrschwirl]			n	M	11 - 50			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Luscinia svecica [Blaukehlchen]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Lymnocyrtus minimus [Zwergschnepfe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Mergus albellus (= Mergellus albellus [Zwergsäuger])			w	G	11 - 50			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Mergus merganser [Gänsesäger]			m	G	251 - 500			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Mergus serrator [Mittelsäger]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Milvus migrans [Schwarzmilan]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Netta rufina [Kolbenente]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]			m	G	11 - 50			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Numenius arquata [Großer Brachvogel]			n	G	6 - 10			1	h	C			C	VR- Zug	2011
AVE	Nycticorax nycticorax [Nachtreiher]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]			n	G	1 - 5			1	w	A			C	VR	2011
AVE	Pandion haliaetus [Fischadler]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Phalacrocorax carbo [Kormoran]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Phalacrocorax carbo [Kormoran]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR- Zug	2011
AVE	Philomachus pugnax [Kampfläufer]			m	G	51 - 100			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Picus canus [Grauspecht]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Platalea leucorodia [Löffler]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Pluvialis apricaria [Goldregenpfeifer]			m	G	1.001 - 10.000			1	m	A			C	VR	2011
AVE	Podiceps auritus [Ohrentaucher]			m	G	1 - 5			1	m	B			B	VR	2011
AVE	Podiceps cristatus [Haubentaucher]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Podiceps grisegena [Rothalstaucher]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR- Zug	2011
AVE	Porzana parva [Kleines Sumpfhuhn]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Porzana porzana [Tüpfelsumpfhuhn]			n	G	6 - 10			1	h	C			C	VR	2011
AVE	Remiz pendulinus [Beutelmeise]			n	M	6 - 10			1	h	B			C	VR- Zug	2011
	Saxicola rubetra														VR-	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AVE	[Braunkohlchen]			n	M	11 - 50			1	h	B			C	Zug	2011
AVE	Sterna hirundo [Flussschwabe]			m	G	1 - 5			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Sterna hirundo [Flussschwabe]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	Sylvia nisoria [Sperbergrasmücke]			n	G	51 - 100			1	w	B			C	VR	2011
AVE	Tachybaptus ruficollis [Zwergtaucher]			m	G	11 - 50			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Tadorna tadorna [Brandgans]			n	M	6 - 10			1	s	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Tadorna tadorna [Brandgans]			m	G	51 - 100			1	m	A			C	VR-Zug	2011
AVE	Tringa erythropus [Dunkelwasserläufer]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Tringa glareola [Bruchwasserläufer]			m	G	51 - 100			1	m	B			C	VR	2011
AVE	Tringa nebularia [Grünschenkel]			m	G	11 - 50			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Tringa ochropus [Waldwasserläufer]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Tringa totanus [Rotschenkel]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Tringa totanus [Rotschenkel]			m	G	6 - 10			1	m	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR-Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]			n	G	11 - 50			1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]			m	G	10.001 - 100.000			1	m	A			B	VR-Zug	2011

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AVE	ATHENOCT	Athene noctua [Steinkauz]					m	1 - 5	g	2011
AVE	PERDPERD	Perdix perdix [Rebhuhn]					n	1 - 5	g	2011

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2019/3437-401_SPA011.htm[11.06.2019 13:28:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63199495898121	Jährling, K.-H.	1998	Deichrückverlegung: Eine Strategie zur Renaturierung und Erhaltung wertvoller Flußlandschaften? - Staatliches Amt für Umweltschutz			56	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

4 VSch-Gebiet und FFH-Gebiet DE 3536-301 „Mahlpfuh- ler Fenn“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3536-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3536-301	Gebietstyp:	C
Landesinterne Nr.:	F35/S26	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Mahlpöfcher Fenn		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,7369	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,4464
Fläche:	1.217,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	Oktober 2000
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			Dezember 2018
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3536	Tangerhütte
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

870	Tangerhütter Niederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Komplexes, weitgehend intaktes Mooregebiet mit wertvollen Eichenmischwäldern und Erlen-Eschenwäldern. Lebensraum typischer Tierarten der Hoch- und Zwischenmoore sowie der Feuchtwälder.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Schutz des besterhaltenen meso- bis oligotroph sauren Hangmoores der Altmark mit aktuellem Moorbewuchs. Sicherung der Umgebung des Moores mit Moorbewäldern und feuchten Stieleichenwäldern sowie eines vielgestaltigen Dünenkomplexes.
Kulturhistorische Bedeutung:	Aus dem Gebiet sind vorgeschichtliche Grabhügel bekannt.
geowissensch. Bedeutung:	Glazilimnische Staubeckenbildungen des Warthestadials.

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-301_F035S026.htm[07.10.2020 10:45:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bemerkung:

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	3 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	10 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	7 %
J1	Hoch- und Übergangsmoorkomplex	2 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	36 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	31 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	10 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3536-301	3536-302	FFH0034	FFH	b	/	Tanger-Mittel- und Unterlauf	75,00	0
3536-301		0010SDL	LSG	b	*	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	11.174,00	82
3536-301		NSG0044	NSG	b	*	Mahlpfuhler Fenn	1.199,00	90

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Änderungen im hydrologischen Regime.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02	anthropogene Veränderungen der hydraulischen Verhältnisse	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
J02.10	Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
K02	Natürliche Entwicklungen, Sukzession	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Börde
Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-301_F035S026.htm[07.10.2020 10:45:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

LSA: LK Stendal
Landkreis Stendal Umweltamt

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan April 2012	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3160	Dystrophe Seen und Teiche	0,1270			G	C			1	B			C	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,4570			G	B			1	C			C	2007
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	0,5430			G	B			1	B			C	2007
6230	Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden	0,0330			G	D			1					2007
6410	Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)	0,4880			G	B			1	B			C	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,7290			G	B			1	A			C	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,5650			G	B			1	B			C	2007
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,0370			G	B			1	C			C	2007
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	0,4060			G	B			1	B			C	2007
7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore	3,8830			G	A			1	B			B	2007
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	3,6000			G	B			1	B			B	2010
9110	Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)	4,7000			G	B			1	C			B	2010
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	16,7000			G	B			1	B			B	2010
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	31,1000			G	B			1	C			B	2010
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	13,8000			G	B			1	B			B	2010
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	58,8000			G	B			1	C			B	2010
91D0	Moorwälder	4,2000			G	A			1	B			C	2010

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-301_F035S026.htm[07.10.2020 10:45:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

91D0	Moorwälder	1,2000				G	A			1	C			C	2010
91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	60,1000				G	B			1	C			B	2010
91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	53,9000				G	B			1	B			B	2010

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AVE	<i>Ciconia nigra</i> [Schwarzstorch]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Columba oenas</i> [Hohltaube]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	<i>Dendrocopos medius</i> [Mittelspecht]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Dryocopus martius</i> [Schwarzspecht]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Emberiza hortulana</i> [Ortolan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Gallinago gallinago</i> [Bekassine]			n	G	1 - 5			1	h	C			C	VR-Zug	2011
AVE	<i>Grus grus</i> [Kranich]			n	G	6 - 10			1	s	B			C	VR	2011
AVE	<i>Haliaeetus albicilla</i> [Seeadler]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR	2011
AVE	<i>Lanius collurio</i> [Neuntöter]			n	G	11 - 50			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Locustella fluviatilis</i> [Schlagschwirl]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	<i>Milvus milvus</i> [Rotmilan]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Pernis apivorus</i> [Wespenbussard]			n	G	1 - 5			1	h	B			C	VR	2011
AVE	<i>Picus canus</i> [Grauspecht]			n	G	1 - 5			1	n	B			C	VR	2011
AVE	<i>Scolopax rusticola</i> [Waldschnepfe]			n	G	6 - 10			1	h	B			C	VR-Zug	2011
AVE	<i>Tringa ochropus</i> [Waldwasserläufer]			n	G	1 - 5			1	w	B			C	VR-Zug	2011
COL	<i>Cerambyx cerdo</i> [Heldbock, Großer Eichenbock]			r	kD	r	2	1	1	h	C	B	C	C	II	2010
COL	<i>Lucanus cervus</i> [Hirschkäfer]			r	kD	r	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2005
COL	<i>Osmoderma eremita</i> [Eremit]			r	kD	v			1	d	B			C	II	2010
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i> [Mopsfledermaus]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2014
MAM	<i>Canis lupus</i> [Wolf]			r	kD	p			1	d	C			C	II	2014
MAM	<i>Castor fiber</i> [Biber]			r	kD	p			1	h	A			C	II	2012
MAM	<i>Lutra lutra</i> [Fischotter]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2014
MAM	<i>Myotis bechsteinii</i> [Bechsteinfledermaus]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2010
MAM	<i>Myotis myotis</i> [Großes Mausohr]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2010
ODON	<i>Coenagrion mercuriale</i> [Helm-Azurjungfer]			r	kD	r	4	4	1	n	B	A	A	B	II	2003

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-301_F035S026.htm[07.10.2020 10:45:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.- Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r	p	g	2001
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2003
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	k	2010
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	k	2009
AMP	RANALESS	Rana lessonae [Kleiner Wasserfrosch]			X		r	p	k	2013
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	k	2001
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	k	2009
AMP	SALASALA	Salamandra salamandra [Feuersalamander]					r	p	t	1999
COL	ACUPFLAV	Acupalpus flavicollis					r	p	t	1999
COL	DEMEMONO	Demetrias monostigma					r	p	t	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	p	k	2011
MAM	MYOTALCA	Myotis alcaethoe [Nymphenfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	MYOTMYST	Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	NYCTLEIS	Nyctalus leisleri [Kleiner Abendsegler]			X		r	p	k	2010
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	k	2010
MAM	PIPINATH	Pipistrellus nathusii [Rauhhaufledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	k	2010
MAM	PLECAURI	Plecotus auritus [Braunes Langohr]			X		r	p	k	2010
ODON	COENHAST	Coenagrion hastulatum [Speer-Azurjungfer]					r	p	t	1999
ODON	LEUCDUBI	Leucorhinia dubia [Kleine Moosjungfer]					r	p	t	1999
ODON	SOMAFILAV	Somatoclora flavomaculata [Gefleckte Smaragdlibelle]					r	p	t	1999
ORTH	MECSGROS	Mecostethus grossus (= Stethophyma grossum [Sumpfschrecke])					r	p	t	1999
PFLA	DACTMAJA	Dactylorhiza majalis [s.str.] [Breitblättriges Knabenkraut]					r	r	g	1999
PFLA	DROSOTU	Drosera rotundifolia [Rundblättriger Sonnentau]					r	p	g	1999
PFLA	ERICETET	Erica tetralix [Glocken-Heide]					r	p	t	1999
PFLA	ERIOANGU	Eriophorum angustifolium [Schmalblättriges Wollgras]					r	p	t	1999
PFLA	ERIOVAGI	Eriophorum vaginatum [Scheiden-Wollgras]					r	p	t	1999
PFLA	LEDUPALU	Ledum palustre [Sumpf-Porst]					r	r	g	1999
PFLA	MENYTRIF	Menyanthes trifoliata [Fiebertee]					r	p	g	1999
PFLA	OSMUREGA	Osmunda regalis [Gewöhnlicher Riesenfarne, Königsfarne]					r	r	g	1999
PFLA	UTRIAUST	Utricularia australis [Verkannter Wasserschlauch]					r	r	l	2016
PFLA	VIOLPALU	Viola palustris [Sumpf-Veilchen]					r	p	t	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r	p	g	2010
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	k	2009

Legende

Grund	Status

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-301_F035S026.htm[07.10.2020 10:45:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0054	Pietsch, W.:	1978	Vegetationsverhältnisse im NSG 'Mahlpfühler Fenn'	Natursch. u. naturkd. Heimatf. in d. Bez. Halle u. Magdeburg	BH	55-79	
st0055	Spitzenberg, D.:	1985	Beiträge zur Insektenfauna der Naturschutzgebiete im Bezirk Magdeburg: 2. Aquatile Coleopteren der Naturschutzgebiete Jeggauer Moor, Jävenitzer Moor und Mahlpfühler Fenn	Abb. u. Berichte für Naturkunde u. Vorgeschichte	6	59-66	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2007
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2010

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

5 FFH-Gebiet DE 3536-302 „Tanger – Mittel- und Unterlauf“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3536-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3536-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0034	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Tanger-Mittel- und Unterlauf		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,8492	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,4906
Fläche:	75,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3436	Lüderitz
MTB	3437	Tangermünde
MTB	3536	Tangerhütte
MTB	3537	Grieben
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

862	Stendaler Land
863	Letzlinger Heide
870	Tangerhütter Niederung
875	Märkische Elbtalniederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Begradigter Flußlauf mit Nebengräben, wichtig als Lebensraum und Verbindungsgewässer wasserbewohnender Tierarten.
Teilgebiete/Land:	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-302_FFH0034.htm[07.10.2020 10:45:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Begründung:	Fließgewässer als Lebensraum bedrohter Tier- und Pflanzenarten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Die vor- und frühgeschichtl. Besiedlung war wahrscheinlich dichter, als die wenigen bekannten Fundstellen aussagen. Im Wald befinden sich zahlreiche Hügelgräber.
geowissensch. Bedeutung:	Holozäne moorartige Flußauensedimente.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	77 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	2 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	9 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	8 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3536-302		BR0004	BR	b	*	Mittelbe	125.510,00	15
3536-302	3437-401	SPA0011	EGV	b	/	Elbaue Jerichow	13.607,00	0
3536-302	3536-301	F35/S26	EGV	b	/	Mahlpfuhler Fenn	1.217,00	0
3536-302	3536-301	F35/S26	FFH	b	/	Mahlpfuhler Fenn	1.217,00	0
3536-302	3537-303	FFH0036	FFH	b	/	Süpling westlich Weißewarte	487,00	0
3536-302	3437-302	FFH0157	FFH	b	/	Elbaue zwischen Derben und Schönhausen	4.383,00	0
3536-302		0097SDL	LSG	b	*	Tanger-Elbeniederung	4.920,00	13
3536-302		0010SDL	LSG	b	*	Uchte-Tangerquellen und Waldgebiete ...	11.174,00	51
3536-302		NSG0044	NSG	b	*	Mahlpfuhler Fenn	1.199,00	2
3536-302		FIB0003	RAM	b	/	Aland-Elbe-Niederung und Elbaue Jerichow	8.605,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	=: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Gewässerausbau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Nährstoffeinträge.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		ausserhalb
J02.05.02	Veränderungen von Lauf und Struktur von Fließgewässern	hoch (starker Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
------	-------------	------	---------------	-----

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-302_FFH0034.htm[07.10.2020 10:45:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Management:

Institute

LSA: LK Stendal
Landkreis Stendal Umweltamt

Status: V: Bewirtschaftungsplan in Vorbereitung

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	2,5390			G	C			1	B			B	2004
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	17,5000			G	C			1	C			B	2004
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodium rubri p.p. und des Bidens p.p.	1,1430			G	B			1	C			A	2004
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1850			G	B			1	B			C	2004
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinus betuli) [Stellario-Carpinetum]	0,0500			G	D			1					2004
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	1,6010			G	D			1					2004
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	0,1660			G	C			1	B			C	2004

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	v			1	h	C			C	II	2010
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	p			1	w	C			C	II	2003
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2012
FISH	Misgurnus fossilis [Schlampeitzger]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2011
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	r	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2008
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	r	1	1	1	h	C	C	C	C	II	2010

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-302_FFH0034.htm[07.10.2020 10:45:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	l	l	l	h	B	C	C	C	II	2014
-----	--------------------------	--	--	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r	p	g	2006
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2000
AMP	RANALESS	Rana lessonae [Kleiner Wasserfrosch]			X		r	p	k	2001
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2001
FISH	ALBUALBU	Alburnus alburnus [Ukelei]					r	p	t	1999
FISH	ANGUANGU	Anguilla anguilla [Aal]					r	p	t	1999
FISH	LEUCDELI	Leucaspis delineatus [Moderlieschen]					r	p	g	1999
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r	p	g	1999
FISH	LOTALOTA	Lota lota [Quappe]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
MAM	MARTMART	Martes martes [Baummarder]				X	r	p	k	2012
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2010

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0273	...	2000	Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg.: v. Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.				

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, I. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2004
--

Dokumentationslink:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-302_FFH0034.htm[07.10.2020 10:45:54]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

--

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

6 FFH-Gebiet DE 3536-303 „Eschengehege nördlich Tangerhütte“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3536-303

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3536-303	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0171	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Eschengehege nördlich Tangerhütte		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,7992	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,4514
Fläche:	165,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3536	Tangerhütte
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

870	Tangerhütter Niederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Sehr gut ausgeprägter Erlen-Eschen-Wald
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Dieser Erlen-Eschen-Wald hat eine sehr gute Ausprägung. Das Waldgebiet bietet aufgrund seiner Größe einer Vielzahl von Arten einen angemessenen Lebensraum.
Kulturhistorische Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
geowissensch. Bedeutung:	Humoses, sandiges Holozän über fluviatilsandigen Weichselsedimenten.
Bemerkung:	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-303_FFH0171.htm[07.10.2020 10:46:11]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	4 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	7 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	87 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	Landesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Veränderungen im hydrologischen Regime.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
J02.05	Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Stendal
Landkreis Stendal Umweltamt

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Jahr
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	1,3880			G	B			I	A			B	2003
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	3,9670			G	B			I	C			B	2003
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	4,7660			G	B			I	B			B	2003
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	7,6080			G	B			I	C			B	2003
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	126,6000			G	B			I	B			B	2003

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr
MAM	Castor fiber [Biber]			e	kD	p			I	h	B			C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	I	I	I	h	B	C	C	C	II	2014

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
MAM	MYOTBRAN	Myotis brandtii [Große Bartfledermaus]			X		r	p g		2010
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p g		2010
MAM	PIPIPYGM	Pipistrellus pygmaeus [Mückenfledermaus]			X		r	p g		2010
MAM	PLECAUST	Plecotus austriacus [Graues Langohr]			X		r	p g		2010

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3536-303_FFH0171.htm[07.10.2020 10:46:11]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203098486951	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.)	2000	Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts			494	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2003 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2007
--

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

7 FFH-Gebiet DE 3634-301 „Klüdener Pax-Wanneweh östlich Calvörde“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3634-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3634-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0025	Biogeografische Region:	A
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Kludener Pax-Wanneh östlich Calvörde		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,3392	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,3939
Fläche:	1.159,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3533	Mieste
MTB	3534	Letzlingen
MTB	3633	Calvörde
MTB	3634	Bülstringen
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

625	Drömling
naturräumliche Haupteinheit:	
D31	Weser-Aller-Flachland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Wertvolles Quell- und Niederungsgebiet mit großer Bedeutung für den Artenschutz.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Strukturreiches Niederungsgebiet mit einem Mosaik aus Erlenbruch-, Erlen-, Eschen- und Stieleichenwäldern. Daneben kommen naturnahe Fließgewässer und zum Teil artenreiche Wiesen vor. Gebiet mit vielfältiger Fauna.
Kulturhistorische	Am Rand der Niederung bzw. auf Talsandinseln befinden sich wenige archäol. Fundstellen, die auf dünne Besiedlung des

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3634-301_FFH0025.htm[07.10.2020 10:48:28]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bedeutung:	Gebietes seit der Jungsteinzeit hinweisen.
geowissensch. Bedeutung:	Glazifluviale Bildungen der Saalekaltzeit, Niederterrassensedimente der Weichselkaltzeit und anmoorige holozäne Bildungen.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	11 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	55 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	4 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	24 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	3 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	1 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3634-301		BR0002	BR	b	-	Drömling Sachsen-Anhalt	22.538,00	100
3634-301	3735-301	FFH0024	FFH	b	/	Untere Ohre	39,00	0
3634-301	3532-301	FFH0020	FFH	b	/	Grabensystem Drömling	775,00	0
3634-301		0031BK	LSG	b	/	Drömling	4.017,00	0
3634-301		NSG0154	NSG	b	=	Klädener Pax-Wanneweh	1.159,00	100

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Abteilung von Oberflächenwasser.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A04	Beweidung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
J02	anthropogene Veränderungen der hydraulischen Verhältnisse	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
J02.03	Kanalisation, Ableitung von Oberflächenwasser	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
J02.10	Entfernen von Wasserpflanzen- u. Ufervegetation zur Abflussverbesserung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3634-301_FFH0025.htm[07.10.2020 10:48:28]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A03	Mahd	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
K02	Natürliche Entwicklungen, Sukzession	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Altmarkkreis Salzwedel Altmarkkreis Salzwedel Amt für Wasserwirtschaft und Naturschutz - Untere Naturschutzbehörde
LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	3,4100			G	D			1					2015
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	4,9100			G	C			1	C			C	2015
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	0,4130			G	C			1	B			C	2015
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	1,3220			G	B	1	1	1	B	B	B	B	2015
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,9470			G	B	1	1	1	C	B	B	B	2015
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	11,6420			G	C	1	1	1	B	B	B	C	2015
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	3,3770			G	D			1					2006
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	25,8500			G	B			1	A			B	2006
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	85,1700			G	B			1	B			B	2006
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	20,1800			G	B			1	C			B	2006
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	23,7200			G	B			1	A			B	2006

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3634-301_FFH0025.htm[07.10.2020 10:48:28]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	37,0960				G	B				I	C			B	2006
91E0	Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	10,4100				G	B				I	B			B	2006

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
AMP	<i>Triturus cristatus</i> [Kammolch]			r	kD	p			l	h	B			B	II	2010
FISH	<i>Lampetra planeri</i> [Bachneunauge]			r	kD	r	3	l	l	h	B	B	B	C	II	2002
FISH	<i>Misgurnus fossilis</i> [Schlammpeitzger]			r	kD	r	2	l	l	h	B	B	B	C	II	1999
MAM	<i>Barbastella barbastellus</i> [Mopsfledermaus]			r	kD	p	2	l	l	h	B	B	C	C	II	2014
MAM	<i>Castor fiber</i> [Biber]			r	kD	r	2	l	l	h	B	B	C	C	II	2010
MAM	<i>Lutra lutra</i> [Fischotter]			r	kD	p	l	l	l	h	B	B	C	C	II	1999
MAM	<i>Myotis bechsteinii</i> [Bechsteinfledermaus]			r	kD	p			l	h	B			B	II	2010

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	<i>Hyla arborea</i> [Laufschwamm]			X		r	p	g	2009
AMP	PELOFUSC	<i>Pelobates fuscus</i> [Knoblauchkröte]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAARVA	<i>Rana arvalis</i> [Moorfrosch]			X		r	p	g	2010
AMP	RANAESCU	<i>Rana kl. esculenta</i> [Teichfrosch]				X	r	p	t	2010
AMP	RANATEMP	<i>Rana temporaria</i> [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2010
FISH	LEUCIDUS	<i>Leuciscus idus</i> [Aland]					r	p	g	1999
FISH	LOTALOTA	<i>Lota lota</i> [Quappe]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	<i>Noemacheilus barbatulus</i> (= <i>Barbatula barbatula</i>) [Bachschmerle, Schmerle]					r	p	g	1999
MAM	MUSTPUTO	<i>Mustela putorius</i> [Iltis]				X	r	p	k	2012
MAM	MYOTBRAN	<i>Myotis brandtii</i> [Große Bartfledermaus]			X		u	r	g	2010
MAM	MYOTNATT	<i>Myotis nattereri</i> [Fransenfledermaus]			X		r	p	g	2010
MAM	NYCTLEIS	<i>Nyctalus leisleri</i> [Kleiner Abendsegler]			X		r	p	g	2010
MAM	NYCTNOCT	<i>Nyctalus noctula</i> [Großer Abendsegler]			X		r	p	g	2009
MAM	PIPIPIPI	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2010
MAM	PIPIPYGM	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> [Mückenfledermaus]			X		r	p	g	2010
MAM	PLECAURI	<i>Plecotus auritus</i> [Braunes Langohr]			X		r	p	g	2009
PFLA	FILAAARVE	<i>Filago arvensis</i> [Acker-Filzkraut]					r	p	g	1999
PFLA	HYDRMORS	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> [Europäischer Froschbiß]					r	p	g	1999
PFLA	THALLUCI	<i>Thalictrum lucidum</i> [Glänzende Wiesenraute]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3634-301_FFH0025.htm[07.10.2020 10:48:28]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0062	Brennecke, R.	1995	Avifaunistischer Jahresbericht 1994 für den Krs. Haldensleben	Haldensleber Vogelkunde - Informationen	Jg.13	5-26	
st0063	Westhus, W.	1995	Landschaftsrahmenplan für den ehemaligen Landkreis Haldensleben : Kartierungsergebnisse				Schube + Westhus, Büro für Freiraumpl.

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2006
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2015

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

8 FFH-Gebiet DE 3636-302 „Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3636-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3636-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0184	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Erlen-Eschenwald westlich Mahlwinkel		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,7622	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,3869
Fläche:	208,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3536	Tangerhütte
MTB	3636	Rogätz
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

870	Tangerhütter Niederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Großer Erlen-Eschenwald, durchflossen von mehreren kleinen Bächen sowie dem Mahlwinkeler Tanger.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Die Erlen-Eschenwälder haben sehr gute Ausprägung und eine repräsentative Größe.
Kulturhistorische Bedeutung:	Da es sich um Teile eines Truppenübungsplatzes handelt, der nur schlecht begangen werden kann, sind nur wenige Fundstellen bekannt.
geowissensch. Bedeutung:	Humoses, sandiges Holozän über fluviatilsandigen Weichselsedimenten.
Bemerkung:	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3636-302_FFH0184.htm[07.10.2020 10:49:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	6 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	4 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	73 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	2 %
N	Nadelwaldkomplexe (bis max. 30% Laubholzanteil)	12 %
R	Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder)	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Intensivierung der Forstwirtschaft und Änderungen des hydrologischen Regimes
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B	Forstwirtschaftliche Nutzung	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
B02.02	Einschlag, Kahlschlag	hoch (starker Einfluß)		innerhalb
J02.05	Änderung des hydrologischen Regimes und Funktionen	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
LSA: LK Stendal Landkreis Stendal Umweltamt

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
-----------------	------

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3636-302_FFH0184.htm[07.10.2020 10:49:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

--

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	0,6710			G	B			1	C			B	2009
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	3,4080			G	B			1	C			B	2009
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinus betuli) [Stellario-Carpinetum]	22,2000			G	B			1	B			B	2004
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinus betuli) [Stellario-Carpinetum]	2,1830			G	B			1	C			B	2004
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	0,9430			G	B			1	C			B	2004
9190	Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur	5,8180			G	B			1	B			B	2004
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	94,9600			G	B			1	B			B	2004
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	2,7210			G	B			1	C			B	2004

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2014

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
MAM	MYOTNATT	Myotis nattereri [Fransenfledermaus]			X		r	p	g	2010
PFLA	ACHIPTA*	Achillea ptarmica [Sumpf-Schafgarbe]					r	p	t	1999
PFLA	BUTOUMBE	Butomus umbellatus [Schwanenblume]					r	p	t	1999
PFLA	EQUIFLUV	Equisetum fluviatile [Teich-Schachtelhalm]					r	p	t	1999
PFLA	SAGISAG	Sagittaria sagittifolia [Gewöhnliches Pfeilkraut]					r	p	t	1999
PFLA	SILASILA	Silaum silaus [Wiesensilge]					r	p	t	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3636-302_FFH0184.htm[07.10.2020 10:49:36]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
ST63203098486951	Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.)	2000	Die Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts			494	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2009
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2004

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

9 FFH-Gebiet DE 3734-301 „Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3734-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3734-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0048	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Olbe- und Bebertal südlich Haldensleben		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,3856	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,2339
Fläche:	152,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3733	Erleben
MTB	3734	Haldensleben
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

504	Magdeburger Börde
naturräumliche Haupteinheit:	
D20	Östliches Harzvorland u. Börden

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Kontinentale Kalk-Halbtrockenrasen, Reste von Eichen-Hainbuchenwäldern und Mähwiesen in Bachtälern am Rand der Magdeburger Börde.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Halbtrockenrasen mit Vorkommen zahlreicher gefährdeter Pflanzenarten, die hier ihre nördliche Verbreitungsgrenze erreichen. Lebensraum zahlreicher gefährdeter Tierarten, z.B. Schalmpeitzger.
Kulturhistorische Bedeutung:	Die Hochufer der Flußläufe wurden zu vor- und frühgeschichtlicher Zeit dicht besiedelt.
geowissensch. Bedeutung:	Porphyrite der Flechtinger-Roßlauer-Scholle unter geringmächtigen holozänen Flußablagerungen.

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3734-301_FFH0048.htm[07.10.2020 10:53:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bemerkung:

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	3 %
F1	Ackerkomplex	16 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	6 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	45 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	6 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	14 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	10 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3734-301		0013OK_	LSG	b	*	Flechtlinger Höhenzug	18.481,00	93
3734-301		NSG0013	NSG	b	*	Wellenberge-Rüsterberg	20,00	12

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einseitig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Nährstoffeintrag aus angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen und z.T. durch Nutzungsaufgabe gefährdet.

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A02	Änderung der Nutzungsart/ -intensität	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		ausserhalb
K02	Natürliche Entwicklungen, Sukzession	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
K02	Natürliche Entwicklungen, Sukzession	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Börde
Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3734-301_FFH0048.htm[07.10.2020 10:53:58]

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	1,6960				G C			1	B			C	2016
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculon fluitantis und des Callitricho-Batrachion	2,0760				G C			1	C			C	2016
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	1,3990				G B	2	1	1	C	B	B	C	2016
6210	Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)(* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen)	0,8710				G B	2	1	1	B	B	B	C	2016
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	1,5260				G B	2	1	1	C	B	B	B	2016
6240	Subpannonische Steppen-Trockenrasen [Festucetalia vallesiacae]	2,8510				G B	2	1	1	B	B	B	B	2016
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,4780				G D			1					2016
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	5,2840				G B	3	1	1	B	B	B	C	2016
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	4,6950				G B	3	1	1	C	B	B	C	2016
8210	Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation	0,0490				G C			1	B			C	2016
8310	Nicht touristisch erschlossene Höhlen	0,0010 Anz.: 1				G C			1	C			C	2016
9130	Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)	0,1560				G D			1					2016
9160	Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum]	0,9680				G C			1	B			C	2016
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	12,1400				G B	1	1	1	B	B	B	C	2016
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	0,7580				G B	1	1	1	C	B	B	C	2016
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	3,6800				G C			1	B			C	2016

							rel -	rel -	rel -				Ges -		Ges -		
--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	-------	--	-------	--	--

SOLplus-AUE-000045-MA-DE 03

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	Grö. N	Grö. L	Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	W. N	Ges.-W. L	W. D	Anh.	Jahr
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	r	3	1	1	h	B	B	B	C	II	2010
FISH	Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger]			r	kD	r	4	2	1	h	B	A	B	C	II	1999
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	1	1	1	h	B	C	C	C	II	2014

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r	r	k	2007
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r	r	g	2010
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r	p	t	2012
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r	p	g	2010
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	g	2012
FISH	LEUCDELI	Leucaspis delineatus [Moderlieschen]					r	p	g	1999
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r	p	g	1999
FISH	LOTALOTA	Lota lota [Quappe]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	t	2009
PFLA	ADONVERN	Adonis vernalis [Frühlings-Adonisröschen]					r	p	l	2015
PFLA	ALLICARI	Allium carinatum [s.l.] [Gekielter Lauch]					r	p	l	2015
PFLA	CAMPBONO	Campanula bononiensis [Bologneser Glockenblume]					r	p	l	2015
PFLA	FILALUTE	Filago lutescens [Gelbliches Filzkraut]					r	p	g	1999
PFLA	INULGERM	Inula germanica [Deutscher Alant]					r	p	g	1999
PFLA	OPHRAPIF	Ophrys apifera [Bienen-Ragwurz]					r	v	l	2015
PFLA	PULSVULG	Pulsatilla vulgaris [s.l.] [Gewöhnliche Kuhschelle i. w. S.]					r	r	t	1999
PFLA	RANULLY	Ranunculus illyricus [Illyrischer Hahnenfuß]					r	p	g	1999
PFLA	SPERPENT	Spergula pentandra [Fünfmänniger Spark]					r	p	g	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3734-301_FFH0048.htm[07.10.2020 10:53:58]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0263	Weinert, E., Hellwig, B.	1987	Verbreitungsmuster kennzeichnender Pflanzenarten im Gebiet des Beber- und Olbetales bei Haldensleben	Hercynia N.F.	24(4)	437- 451	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbilddauswertung. Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2016 Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2016
--

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

10 FFH-Gebiet DE 3734-302 „Haldensleben, Fledermausquartier Bornsche Str. 25“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3734-302

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3734-302	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0206	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Haldensleben, Fledermausquartier Bornsche Str. 25		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,4128	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,2958
Fläche:	0,02 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	März 2004	Als GGB bestätigt:	Januar 2008
Ausweisung als BEG:	April 2017	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:			
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	September 2003	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:			
Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))			

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3734	Haldensleben
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

863	Letzlinger Heide
naturräumliche Haupteinheit:	
D29	Wendland (Altmark)

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Gebäude
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Fledermausvorkommen.
Kulturhistorische Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
geowissensch. Bedeutung:	Es liegen keine Informationen vor.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	100 %
---	---	-------

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3734-302_FFH0206.htm[07.10.2020 10:54:33]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
K03.02	Parasitismus bei Tieren	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

L-SA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Erhalt. u. Wiederherst. eines günst. Erhaltungszust. der gemeldeten Lebensr. (einschl. aller dafür charakterist. Arten) n. Anh. 1 und d. Arten n. Anh. 2 FFH-RL
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten- Qual.	Rep.	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Erh.- Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3734-302_FFH0206.htm[07.10.2020 10:54:33]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			b	G	251 - 500	3	2	1	h	A	A	A	B	II	2010
-----	--------------------------------------	--	--	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
MAM	EPTESERO	Eptesicus serotinus [Breitflügel-Fledermaus]			X		r	p g		2010

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag

Dokumentation/Biotopkartierung:

Fledermauserfassung Protokoll Gebietsbegehung Landkreis Börde am 04.08.2015
--

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

11 FFH-Gebiet DE 3735-301 „Untere Ohre“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3735-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3735-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0024	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Untere Ohre		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,5400	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,2633
Fläche:	39,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3634	Bülstringen
MTB	3734	Haldensleben
MTB	3735	Wolmirsted
MTB	3736	Zielitz
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
------	----------------

Naturräume:

625	Drömling
863	Letzlinger Heide
875	Märkische Elbtalniederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D29	Wendland (Altmark)

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ohrelauf als wichtiges Verbindungsgewässer für gewässerbewohnende Arten zwischen Drömling und Elbe.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Bedeutendes Fließgewässer mit Funktion als überregionales Vernetzungselement zur Ausbreitung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, z.B. Biber, Fischotter

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3735-301_FFH0024.htm[07.10.2020 10:55:26]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Kulturhistorische Bedeutung:	Am Rand der Niederung bzw. auf Talsandinseln befinden sich wenige archäol. Fundstellen, die auf dünne Besiedlung des Gebietes seit der Jungsteinzeit hinweisen.
geowissensch. Bedeutung:	Fluviatile Sedimente der weichselkaltzeitliche Niederterrasse.
Bemerkung:	

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	100 %
---	----------------	-------

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3735-301		BR0004	BR	b	/	Mittelbe	125.510,00	0
3735-301		BR0002	BR	b	*	Drömling Sachsen-Anhalt	22.538,00	1
3735-301	3437-401	SPA0011	EGV	b	/	Elbaue Jerichow	13.607,00	0
3735-301	3634-301	FFH0025	FFH	b	/	Klädener Pax-Wanneh östlich Calvörde	1.159,00	0
3735-301	3736-301	FFH0038	FFH	b	/	Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung	1.663,00	0
3735-301		0109BK	LSG	b	*	Ohre- u. Elbniederung	5.909,00	27
3735-301		NSG0154	NSG	b	/	Klädener Pax-Wanneh	1.162,00	0
3735-301		NSG0015	NSG	b	/	Rogätz Hang - Ohremündung	259,00	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	~: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Das Gebiet ist durch Einleitung kommunaler Abwässer und durch Intensivierung der Gewässerunterhaltung gefährdet.
--

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A08	Düngung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb
E02.01	Produktionsstätten (Fabriken)	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
E06	Sonstige Siedlungs-, gewerbliche oder industrielle Aktivitäten	hoch (starker Einfluß)		ausserhalb
F02.03	Angelsport, Angeln	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
H05	Bodenverschmutzung und Feststoffe (ohne Deponien)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort

Management:

Institute

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3735-301_FFH0024.htm[07.10.2020 10:55:26]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

LSA: LK Börde
Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten

Status: N: Bewirtschaftungsplan liegt nicht vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	3,9400			G	C			1	A			B	2009
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	1,7900			G	C			1	C			B	2009
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculus fluitantis und des Callitriche-Batrachion	30,1400			G	C			1	B			B	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,0740			G	C			1	B			C	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,1900			G	C			1	A			C	2009

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.-Qual.	Pop.-Größe	rel-Grö. N	rel-Grö. L	rel-Grö. D	Biog.-Bed.	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Anh.	Jahr
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	r			1	w	C			C	II	2004
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	p			1	h	C			C	II	2012
FISH	Misgurnus fossilis [Schlammpeitzger]			r	kD	r	3	1	1	h	B	A	B	C	II	2004
FISH	Rhodeus sericeus amarus (= Rhodeus amarus [Bitterling])			r	kD	p			1	h	C			C	II	2008
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	c	5	1	1	h	B	A	B	C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	p	2	1	1	h	B	B	B	C	II	2014
MAM	Myotis myotis [Großes Mausohr]			r	kD	p			D	h					II	2009
ODON	Ophiogomphus cecilia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]			r	kD	p			1	w	B			B	II	2008

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
-------	------	------	---	----	---------	--------	--------	------------	-------	------

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doing_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3735-301_FFH0024.htm[07.10.2020 10:55:26]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r	p	k	2005
FISH	CARACARA	Carassius carassius [Karausche]					r	p	g	1999
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r	p	g	1999
FISH	LOTALOTA	Lota lota [Quappe]					r	p	g	1999
FISH	NOEMBARB	Noemacheilus barbatulus (= Barbatula barbatula [Bachschmerle, Schmerle])					r	p	g	1999
FISH	SALMTR_F	Salmo trutta fario (= Salmo trutta [Forelle, Bachforelle])					r	p	g	1999
MAM	MUSTPUTO	Mustela putorius [Iltis]				X	r	p	k	2012
MAM	MYOTDAUB	Myotis daubentonii [Wasserschneckenfledermaus]			X		r	p	k	2009
MAM	NYCTLEIS	Nyctalus leisleri [Kleiner Abendsegler]			X		r	p	k	2009
MAM	NYCTNOCT	Nyctalus noctula [Großer Abendsegler]			X		r	p	k	2009
MAM	PIPIPIPI	Pipistrellus pipistrellus [Zwergfledermaus]			X		r	p	k	2009
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r	p	g	1999
REP	LACEVIVI	Lacerta vivipara (= Zootoca vivipara [Waldeidechse])					r	p	t	1999

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	c: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0209	Kammerad, B., Wüstemann, O., Gohr, F.	1992	Ergebnisse der Fischbestandserfassung in der Ohre (Raum Calvörde) und Vorschläge für die Schaffung von Fischaufliegstellen	Bericht Fischereiverwaltung Bez.-Reg. Magdeburg			

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, I. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Offenland-LRT 2009

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3735-301_FFH0024.htm[07.10.2020 10:55:26]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %

12 FFH-Gebiet DE 3736-301 „Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung“ (ST)

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 3736-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

Gebietsnummer:	3736-301	Gebietstyp:	B
Landesinterne Nr.:	FFH0038	Biogeografische Region:	K
Bundesland:	Sachsen-Anhalt		
Name:	Elbaue südlich Rogätz mit Ohremündung		
geografische Länge (Dezimalgrad):	11,7492	geografische Breite (Dezimalgrad):	52,2731
Fläche:	1.663,00 ha		
Vorgeschlagen als GGB:	Oktober 2000	Als GGB bestätigt:	Dezember 2004
Ausweisung als BEG:	Dezember 2018	Meldung als BSG:	
Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:			
Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:	Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018		
Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets:			
Bearbeiter:			
Erfassungsdatum:	Februar 2000	Aktualisierung:	Juli 2020
meldende Institution:	Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale))		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	3636	Rogätz
MTB	3736	Zielitz
Inspire ID:		
Karte als pdf vorhanden?	nein	

NUTS-Einheit 2. Ebene:

DEE0	Sachsen-Anhalt
DEE0	Sachsen-Anhalt

Naturräume:

875	Märkische Elbtalniederung
naturräumliche Haupteinheit:	
D09	Elbtalniederung

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Charakteristischer Gebietsausschnitt der Ohre-Elbe-Aue mit naturnahen Waldgesellschaften, Wiesen, einem Hangquellmoor und Feuchtgebieten.
Teilgebiete/Land:	
Begründung:	Ausschnitt einer naturnahen Flußlandschaft. Lebensraum seltener Tier- und Pflanzenarten. Bedeutendes Nahrungs-, Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet autotypischer Vogelarten.
Kulturhistorische Bedeutung:	Im Gebiet sind nur Einzelfunde oder historisch überlieferte Wüstungen bekannt, die Niederung war früher und ist heute siedlungsgünstig.
geowissensch.	Grundmoräne des Warthestadials. Urstromtal.

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3736-301_FFH0038.htm[07.10.2020 10:55:49]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

Bedeutung:	
Bemerkung:	Das Gebiet wird mit der Aktualisierung vom Februar 2004 flächenmäßig erweitert gemeldet, gegenüber der im Oktober 2000 erfolgten Meldung an die EU-KOM.

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	15 %
E	Fels- und Rohbodenkomplexe	2 %
F1	Ackerkomplex	19 %
G	Grünlandkomplexe trockener Standorte	2 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	30 %
I1	Niedermoorkomplex (auf organischen Böden)	1 %
I2	Feuchtgrünlandkomplex auf mineralischen Böden	15 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	12 %
L04	Forstliche Laubholzkulturen (standortsfremde oder exotische Gehölze)'Kunstforsten'	1 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	3 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
3736-301		BR0004	BR	b	*	Mittelelbe	125.510,00	97
3736-301	3437-401	SPA0011	EGV	b	-	Elbaue Jerichow	13.607,00	100
3736-301	3735-301	FFH0024	FFH	b	/	Untere Ohre	39,00	0
3736-301	3637-301	FFH0037	FFH	b	/	Elbaue bei Bertingen	2.798,00	0
3736-301	3936-301	FFH0050	FFH	b	/	Elbaue zwischen Saalemündung und Magdeburg	6.589,00	0
3736-301		00109BK	LSG	b	*	Ohre- u. Elbniederung	7.067,00	49
3736-301		0092JL_	LSG	e	*	Elbtalau	7.607,00	43
3736-301		NSG0015	NSG	b	+	Rogätzer Hang-Ohremündung	259,00	16
3736-301		NSG0189	NSG	b	+	Taufwiesenberge	47,00	3

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

--

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

Zunehmende tourist. Aktivitäten. Bereichsweise zunehmende Salzbeeinflussung aus histor. u. aktuellen Abraumhalden des Salzbergbaus außerhalb d. Gebietes durch niederschlagsabhängige Auslaugung. Langfristig wird d. Einfluß d. Kalihalden wirksam

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
A01	Landwirtschaftliche Nutzung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A04	Beweidung	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3736-301_FFH0038.htm[07.10.2020 10:55:49]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

A07	Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
A08	Düngung	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
C01.05	Saline (Salzbergwerk)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

Code	Bezeichnung	Rang	Verschmutzung	Ort
B02.01	Wiederaufforstung (auf Waldbodenfläche, z.B. nach Einschlag)	gering (geringer Einfluß)		innerhalb
L08	Hochwasser, Überschwemmung (natürlich)	mittel (durchschnittlicher Einfluß)		innerhalb

Management:

Institute

LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten
LSA: LK Jerichower Land Landkreis Jerichower Land Kreisverwaltung - FB 7 - Umwelt und Landwirtschaft

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

Maßnahme / Plan	Link
Managementplan Oktober 2009	http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/

Erhaltungsmassnahmen:

Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA)
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

Code	Name	Fläche (ha)	PF	NP	Daten-Qual.	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland]	8,9600			G	B			1	A			B	2009
2330	Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland]	16,5900			G	B			1	B			B	2009
3150	Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions	11,8900			G	B			1	B			B	2009
3260	Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitriche-Batrachion	4,5100			G	B			1	B			B	2009
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.	41,9030			G	B			1	B			B	2009
3270	Flüsse mit Schlammbänken mit Vegetation des Chenopodion rubri p.p. und des Bidention p.p.	3,4000			G	B			1	A			B	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	0,9700			G	B			1	B			B	2009
6430	Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe	6,6400			G	B			1	A			B	2009
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	76,6900			G	B			1	B			A	2009
6440	Brenndolden-Auenwiesen (Cnidion dubii)	7,0800			G	B			1	A			A	2009

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3736-301_FFH0038.htm[07.10.2020 10:55:49]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	203,5000				G	B				I	B			B	2009
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	33,9000				G	B				I	A			B	2009
6510	Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	33,1900				G	B				I	C			B	2009
9170	Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum	6,3300				G	C				I	B			B	2009
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	62,4400				G	A				I	B			B	2009
91E0	Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno- Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	10,8900				G	A				I	A			B	2009
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)	144,9000				G	B				I	B			A	2009
91F0	Hartholzauenwälder mit Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus angustifolia (Ulmion minoris)	62,1400				G	B				I	C			A	2009

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

Taxon	Name	S	NP	Status	Dat.- Qual.	Pop.- Größe	rel.- Grö. N	rel.- Grö. L	rel.- Grö. D	Biog.- Bed.	Erh.- Zust.	Ges.- W. N	Ges.- W. L	Ges.- W. D	Anh.	Jahr
AMP	Bombina bombina [Rotbauchunke]			r	kD	r	3	2	1	w	B	B	B	B	II	2010
AMP	Triturus cristatus [Kammolch]			r	kD	p			1	h	B			C	II	2010
COL	Cerambyx cerdo [Heldbock, Großer Eichenbock]			r	kD	c			1	d	C			C	II	2009
COL	Osmoderma eremita [Eremit]			r	kD	p			1	d	C			C	II	2011
FISH	Aspius aspius [Rapfen]			r	kD	r	2	2	1	w	B	B	B	B	II	2005
FISH	Cobitis taenia [Steinbeißer]			r	kD	p			1	h	C			C	II	2005
FISH	Lampetra fluviatilis [Flußneunauge]			m	kD	v	3	3	1	h	B	A	A	C	II	2011
FISH	Romanogobio belingi [Stromgründling]			r	kD	p			1	d	C			C	II	2005
FISH	Salmo salar [Lachs (nur im Süßwasser)]			m	kD	r	3	3	1	h	B	A	A	C	II	2011
MAM	Castor fiber [Biber]			r	kD	p	2	2	1	h	B	B	B	C	II	2010
MAM	Lutra lutra [Fischotter]			r	kD	r	1	1	1	h	B	B	B	C	II	2009
ODON	Leucorrhinia pectoralis [Große Moosjungfer]			r	kD	r	2	2	1	h	B	B	B	C	II	2009
ODON	Ophiogomphus cecidia [Grüne Flußjungfer, Grüne Keiljungfer]			r	kD	p			1	w	B			B	II	

weitere Arten

Taxon	Code	Name	S	NP	Anh. IV	Anh. V	Status	Pop.- Größe	Grund	Jahr

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3736-301_FFH0038.htm[07.10.2020 10:55:49]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

AMP	BUFOCALA	Bufo calamita [Kreuzkröte]			X		r		p	g	2010
AMP	BUFOVIRI	Bufo viridis [Wechselkröte]			X		r		p	g	2010
AMP	PELOFUSC	Pelobates fuscus [Knoblauchkröte]			X		r		p	-	2010
AMP	RANAARVA	Rana arvalis [Moorfrosch]			X		r		p	-	2012
AMP	RANAESCU	Rana kl. esculenta [Teichfrosch]				X	r		p	t	2012
AMP	RANARIDI	Rana ridibunda [Seefrosch]				X	r		p	g	2010
AMP	RANATEMP	Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch]				X	r		p	g	2010
COL	AGONVERS	Agonum versutum [Auen-Glanzflachläufer]					r		p	g	1999
COL	BADIMERI	Badister meridionalis [Bogenfleck-Wanderläufer]					r		p	g	1999
COL	STENSKRI	Stenolophus skrimshiranus [Rötlicher Scheibenhals-Schnellläufer]					r		p	g	1999
FISH	ALBUALBU	Alburnus alburnus [Ukelei]					r		p	t	1999
FISH	BARBBARB	Barbus barbus [Barbe]				X	r		p	g	2005
FISH	LEUCIDUS	Leuciscus idus [Aland]					r		p	g	1999
FISH	LOTALOTA	Lota lota [Quappe]					r		p	g	1999
MAM	MUSTPUTO	Mustela putorius [Iltis]				X	r		p	k	2012
MAM	PIPINATH	Pipistrellus nathusii [Rauhhaufledermaus]			X		r		p	g	2008
MAM	PIPIPYGM	Pipistrellus pygmaeus [Mückenfledermaus]			X		r		v	g	2008
ODON	AESHVIRI	Aeshna viridis [Grüne Mosaikjungfer]			X		r		p	g	2010
ODON	CALOSPLE	Calopteryx splendens [Gebänderte Prachtlibelle]					r		p	t	1999
ODON	GOMPFLAV	Gomphus flavipes [Asiatische Keiljungfer]			X		r		p	g	2010
ODON	LESTBARB	Lestes barbarus [Südliche Binsenjungfer]					r		p	t	1999
ODON	LEUCALBI	Leucorrhinia albifrons [Östliche Moosjungfer]			X		r		p	g	2008
ODON	LEUCCAUD	Leucorrhinia caudalis [Zierliche Moosjungfer]			X		r		r	-	2008
ORTH	LEPTALBO	Leptophyes albobittata [Gestreifte Zartschrecke]					r		p	t	1999
PFLA	ADONVERN	Adonis vernalis [Frühlings-Adonisröschen]					r		p	l	2015
PFLA	ALISGRAM	Alisma gramineum [Grasblättriger Froschlöffel]					r		p	t	1999
PFLA	ALLIANGU	Allium angulosum [Kantiger Lauch]					r		p	g	1999
PFLA	ANTEDIOI	Antennaria dioica [Gewöhnliches Katzenpfötchen]					r		r	l	2015
PFLA	CNIDDUBI	Cnidium dubium [Sumpfbrenndolde]					r		p	g	1999
PFLA	MENTPULE	Mentha pulegium [Polei-Minze]					r		p	g	1999
PFLA	PULIVULG	Pulicaria vulgaris [Kleines Flohkraut]					r		p	g	1999
PFLA	VIOLPERS	Viola persicifolia [Gräben-Veilchen]					r		p	g	1999
REP	COROAUST	Coronella austriaca [Schlingnatter]			X		r		p	k	2014
REP	LACEAGIL	Lacerta agilis [Zauneidechse]			X		r		p	g	2014

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fahrten- u. sonst. indirekte Nachweise

file:///lau.mlu.lsa-net.de/dfs/home/doering_m/Meldung_Gesamtlisten%20SDB/Gesamtlisten_SDB_2020/3736-301_FFH0038.htm[07.10.2020 10:55:49]

vollständige Gebietsdaten, Berichtspflicht 2018, auf Bundeslandebene (Sachsen-Anhalt)

z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	
r: selten, mittlere bis kleine Population (rare)	
v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
st0005	...	1997	Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt				G. Fischer
st0283	Böhnert, W., Zörner, G.	1979	Beitrag zur Kenntnis des erweiterten Naturschutzgebietes 'Rogätzter Hang'..	Nat-schutz u.naturschutzkundl.Heimatsforsch.i.d.Bez.HAL u.MD	16(1)	14-38	
st0269	Ruge, Ursula, Otto, Margit (Bearb.)	1999	Naturschutzgebiete und Großschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt.	Dokumentation Natur und Landschaft N. F.	39(30)	145	
st0284	Stein, H.	1969	Der Barleber See bei Magdeburg - ein Rast- und Überwinterungsgewässer für Wasservögel.	Naturkundliche Jahresberichte des Museums Heineanum.	4	25-54	

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald- und Offenland-LRT 2009

Dokumentationslink:

Eigentumsverhältnisse:

Bund	0 %
Land	0 %
Kommunen	0 %
Sonstige	0 %
gemeinsames Eigentum/Miteigentum	0 %
Privat	0 %
Unbekannt	0 %



Energie für eine Welt in Bewegung

50Hertz Transmission GmbH

Heidestr. 2
10557 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (30) 5150-0
Fax +49 (30) 5150-4477
info@50hertz.com
www.50hertz.com